


MII : MESURES PREVENTIVES DU PALUDISME



MESURES PRÉVENTIVES

Au niveau individuel :

- Le meilleur moyen de prévenir les piqûres de moustiques est de dormir sous une moustiquaire traitée avec un insecticide recommandé.

A défaut des moustiquaires imprégnées,

- Placer des rideaux, des tissus ou des nattes imprégnés de l'insecticide recommandé devant les portes et les fenêtres




MESURES PRÉVENTIVES *(suite)*

- Utiliser les crèmes ou les savons antimoustiques ou autres fumigènes
- Porter des vêtements couvrant les bras et les jambes (Chemises à manches longues, jupes ou pantalons longs) surtout entre le coucher et le lever du soleil, quand les moustiques sont le plus actifs. Cette mesure est particulièrement importante pour les enfants et les femmes enceintes.

MESURES PRÉVENTIVES *(suite)*

Chez la femme enceinte

- Dormir sous une moustiquaire imprégnée
- Suivre un traitement préventif (TPI) en prenant un antipaludique prescrit par un agent de santé durant toute sa grossesse pour se protéger et protéger son bébé



Les dispensaires de santé infantile, de planification familiale et de soins primaires servent de cadre à la lutte antipaludique pendant la grossesse

MESURES PRÉVENTIVES *(suite)*

Au niveau de la famille

- Les bébés et autres jeunes enfants doivent dormir sous une moustiquaire traitée. Si les moustiquaires sont chères, la famille devrait en acheter au moins une grande qui puisse protéger tous les jeunes enfants.
- Les bébés nourris au sein devraient dormir avec leur mère sous une moustiquaire.

A défaut des moustiquaires imprégnées,

- Placer des rideaux, des tissus ou des nattes imprégnés de l'insecticide recommandé devant les portes et les fenêtres

MESURES PRÉVENTIVES *(suite)*

- Fixer des treillis moustiquaires aux portes et aux fenêtres
- Utiliser les crèmes ou les savons antimoustiques ou autres fumigènes
- Utiliser les bombes insecticides
- Tuer les moustiques qui sont dans la maison avant de dormir
- Porter des vêtements couvrant les bras et les jambes (Chemises à manches longues, jupes ou pantalons longs) dès qu'il commence à faire nuit. Cette mesure est particulièrement importante pour les enfants et les femmes enceintes.

MESURES PRÉVENTIVES (suite)

Au niveau de la communauté

Il faut tuer les larves de moustiques :

- En comblant ou en drainant les endroits où l'eau stagne
- En couvrant les flaques d'eau, les récipients et les citernes
- En asséchant tour à tour les rizières après les récoltes et en y introduisant les poissons larvivores
- En nettoyant la broussaille aux alentours des maisons
- En faisant le compostage des déchets ménagers.

LA MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE: UN MOYEN DE PROTECTION

- Une fois imprégnées de l'insecticide **recommandé**, les moustiquaires tuent les moustiques au contact. Il faudrait utiliser des moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée ou régulièrement trempées dans l'insecticide.
- Généralement, il convient de retraiter la moustiquaire au début de la saison des pluies, au moins tous les six mois et après le troisième lavage.
- Son efficacité dépend de son utilisation: Il ne suffit donc pas d'avoir une moustiquaire mais il faut dormir sous la moustiquaire. La moustiquaire ne tue les moustiques que si elle est imprégnée régulièrement.

